





# Ageratum

JJ (A18)

Cuttings

El Ageratum, también conocido como “floss-flower” por sus pétalos similares al hilo dental, tiene pequeñas flores que se asemejan a pompones esponjosos. Las flores se producen en racimos densos en color morado añade un toque de frescura y vitalidad a cualquier composición floral. Sus flores, delicadas y abundantes, se destacan por su durabilidad,

- **Se destaca por su variedad única en el mundo de flores de corte.**
- **Sus colores morados poseen una textura singular y distintiva.**
- **No produce pólen.**

Ball SB



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### TIPO DE CULTIVO
Anual

### CICLOS
De siembra al inicio de cosecha: 13 Semanas. Spam de cosecha 3 Semanas.

### DENSIDAD DE SIEMBRA
28 plantas $m^2$ neto

### PRE-SIEMBRA

**Suelo:** Bien drenado.
**Malla:** 2 niveles
**pH:** 5.5 – 6.2

### PINCH
Pinch semana 2 dejando 2 pares de hojas. 3-4 tallos por planta. No dejar más de 4 tallos por planta. Tallos mercado internacional mínimo 70cm de largo.

### DESBROTE
Iniciar 5 semanas después de siembra cuando se hayan desarrollado los primeros brotes laterales. Retire los brotes laterales a medida que el tallo crezca. Deje solo la inflorescencia apical. Los brotes removidos no vuelven a salir.

### FERTILIZACIÓN
Una fórmula general de fertilización puede ser la siguiente.

N: 80 ppm , P: 50 ppm, K: 100 ppm
Ca: 100 ppm, Mg: 40 ppm, S: 50 ppm
Fe: 2 ppm, Mn: 2.5 ppm, Cu,: 0.2 ppm
Zn: 0.2 ppm, B: 0.2 ppm.

### COSECHA
Cosechar con el 100% de flores abiertas. La flor no abre en florero.



Evitar cosechar la flor humeda y turgida. Reducir riego por debajo de la capacidad de campo 2 semanas antes de cosechar. Deshojar completamente los tallos.

### POST-COSECHA
Colocar ramo con capuchón microperforado en seco dur 2 horas, seguido de hidratación con HydraFlor Clear Ultra 1 mL/L por 4hr a T°C ambiente, pH (≥ 3) y CE (0 - 1.5 mS/cm). Evitar rotación del producto en frio.

### PLAGAS Y ENFERMEDADES
- Botrytis
- Trips
- Mosca Blanca