




Carthamus



Seeds



Plugs

Carthamus también conocida como Cártamo o Alazor, es una flor de aspecto salvaje con pequeñas espigas, que le da un aspecto salvaje y divertido a los arreglos. Se usaba para encontrar un nuevo amor o matrimonio cuando se entrega como regalo. También están asociadas con la buena suerte y alegrías.

- Tallo con longitud uniforme en toda la serie
- Excelente para usar como flor de corte o para secar
- También se puede usar verde cuando se cosecha antes
- Se puede utilizar para hibernadero o para siempre al aire libre

COLORES:



Grenade Orange



Zanzibar

INFORMACIÓN TÉCNICA

CICLOS

De siembra a cosecha: 16 semanas

DENSIDAD DE SIEMBRA

80 plantas/m² neto

PRE-SIEMBRA

Suelo: Bien drenado, suelto y con una superficie bien nivelada. Al menos 25 cm de profundidad

pH: 5.5 to 6.5

Malla: 2 niveles

DESCABECE

Elimine el botón floral principal apenas aparezca para incentivar el desarrollo uniforme de los demás puntos florales y uniformidad la apertura.

Esto ocurre entre semana 8-9 después de la siembra.

RIEGO

Mantener humedad del suelo a capacidad de campo. Aplicar de 5,0-5,5 l/m²/día de acuerdo al monitoreo organoléptico.

MANEJO DE B9

Aplicar:

4000 ppm 3 wks después de siembra

1000 ppm 4 wks después de siembra

FERTILIZACIÓN

Una fertilización nitrogenada alta puede ocasionar un crecimiento excesivo de las plantas. Una formula general puede ser la siguiente:

N: 80ppm

P: 40 ppm

K: 160 ppm

Ca: 120 ppm,

Mg: 60 ppm

S: 50 ppm,

Fe: 2 ppm,

Mn: 2.5 ppm,

Cu, Zn y B: 0.2 ppm.

COSECHA

Coseche cuando las flores estén empezando a desplegar los pétalos. Las flores se enmallan individualmente y se arman ramos de 10 tallos.

POST-COSECHA

Hidratar en solución AVB (0.5 cm³ /Lt de Agua + AVB Booster (1 cm³/Lt) x 4 horas. Luego hidratar en CHRYSAL PROFESSIONAL 2 (10 cm³/Lt) x 4 horas.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Afidos

Thrips

Botrytis

Susceptible a toxicidades hacer pruebas a fitotoxicidades antes de aplicar cualquier producto químico.