

Limonium

SINENSIS

Tissue Culture





Limonium, proviene de la palabra griega "pradera" que se refiere a su hábitat original. Limonium originalmente creció en prados a lo largo del mar en el Mediterráneo. Esta flor trae a nuestros hogares la sensación fresca de estar cálido y relajado en una pradera de brisa en el Mediterráneo Limonium simboliza el recuerdo, el éxito, la simpatía y la belleza.

- **Seleccionada por la carencia del típico olor fuerte de los Limoniums, tallos fuertes, colores vibrantes, productividad alta y varias cosechas**
- **La serie Ever es una nueva serie Japonesa de cultivo de tejido perfecta para bouquets y ramos sólidos**
- **Perfecto para tinturar**

BallSB

COLORES:



Ever Snow



Ever Rose

INFORMACIÓN TÉCNICA

CICLOS
De siembra a cosecha: 16 semanas
De poda a cosecha: 14 semanas.

DENSIDAD DE SIEMBRA
6 plantas/m ^{2} (1 planta/pie^2 neto). La siembra se realiza entresbolillo dejando 40 cm entre hileras.

PRE-SIEMBRA
Suelo: Se requiere un suelo suelto bien drenado con una superficie nivelada. Al menos 25 cm de profundidad.
pH: 5.5 a 6.5
Malla: 2-3 niveles

DESPUNTE
Se realiza cuando el primer tallo esta inducido, con el fin de estimular la brotación basal de nuevos tallos. Se debe tener cuidado de no dañar los puntos de crecimiento al realizar esta labor.

INDUCCIÓN DE TALLOS
Las condiciones de frío son más favorables para que ocurra la inducción de tallos. Aplicar 150 ppm de Ácido Giberélico, después del pinch. Una segunda aplicación de Ácido Giberélico puede realizarse a las plantas que no hayan inducido tras la primera aplicación.

RIEGO
En producción mantener un volumen de riego entre 5- 5,5 L/m2 de acuerdo a las condiciones ambientales y al monitoreo organoléptico.

FERTILIZACIÓN
Una fórmula generalde fertilicación puede ser la siguiente:

N: 120 ppm
P: 50 ppm
K: 120 ppm
Ca: 180 Ppm
Mg: 50 ppm
S: 50 ppm
Fe: 2 ppm
Mn:2.5 ppm
Cu, Zn
B: 0.2 ppm

COSECHA
Cosechar cuando mínimo de 50% de las flores estén abiertas. Las flores no abren después de ser cortadas.

POST-COSECHA
Hidratar con solución inicial Chrysal 0,3 cc/litro x 4 horas.

PLAGAS Y ENFERMEDADES
Botrytis sp.
Thrips
Babosas